

Les troubles de la vue chez l'enfant

**LES TROUBLES DE LA VUE DOIVENT ÊTRE REPERES AU PLUS VITE.
UN TRAITEMENT RAPIDE AVEC UN SUIVI RÉGULIER PERMET
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE LA VUE DE VOTRE ENFANT.**





Un trouble de la vue, qu'est-ce que c'est ?

Les problèmes de vue ont des origines très diverses. Il est important de dépister les troubles visuels au plus vite afin d'offrir à votre enfant la meilleure prise en charge possible. Plus le dépistage est précoce, plus le traitement sera efficace.

90% de l'apprentissage d'un enfant est directement lié à ce qu'il voit. La vision est donc nécessaire pour communiquer, pour jouer, pour discuter, pour lire, pour écrire...

Les signes d'alerte

Plusieurs éléments peuvent vous faire suspecter un trouble de la vue, à tout âge :




- Votre enfant est gêné et fuit la lumière
- Il ne s'intéresse pas à ce qui l'entoure
- Il a les yeux qui tremblent dans tous les sens
- Il appuie sur son œil
- Son regard plafonne ou reste fixé vers le bas
- Il louche ou a «l'œil qui part»
- Il a une tâche blanche dans l'œil
- Il se cogne ou tombe facilement, il est maladroit
- Il se frotte ou plisse souvent les yeux
- Il a les yeux rouges et/ou qui pleurent souvent
- Il penche ou tourne la tête pour mieux voir
- Il a des difficultés d'apprentissages
- Il s'approche trop près des écrans ou de ses cahiers
- Il a souvent mal à la tête

Tout enfant peut souffrir de troubles de la vue, en particulier les prématurés, les enfants nés avec un poids inférieur à 2,5kg ou si dans votre famille des troubles de la vue sont connus. Soyez vigilants à ces signes et n'hésitez pas à solliciter votre médecin traitant en cas de doute.

LES TROUBLES DE LA VUE DOIVENT ETRE REPERES AU PLUS VITE. UN TRAITEMENT RAPIDE AVEC UN SUIVI REGULIER PERMET UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE LA VUE DE VOTRE ENFANT.

Les différents troubles de la vue

1 L'amblyopie




L'amblyopie se caractérise par une mauvaise vision d'un ou des 2 yeux, dont le traitement ne se limite pas uniquement au port de lunettes correctrices.

2 Le strabisme

Le strabisme désigne des yeux qui ne sont pas parallèles.

C'est classiquement le cas d'un enfant qui louche ou qui a un «œil qui part».




3 La myopie



La myopie indique que la vision de loin est mauvaise.

4 L'hypermétropie

L'hypermétropie indique que la vision de près est mauvaise.



5 L'astigmatisme



L'astigmatisme est une vision déformée des lignes qui peut se combiner avec la myopie ou l'hypermétropie. L'enfant a une perception déformée des lignes horizontales, verticales ou obliques.





À qui s'adresser ?



Des professionnels de santé peuvent vous aider en cas de trouble de la vue suspecté, rapprochez-vous de :

- Votre **médecin généraliste, pédiatre** ou **médecin de PMI** qui peut dépister des troubles de la vue, notamment lors des bilans du 9^{ème} et 24^{ème} mois.
- L'**ophtalmologiste**, « médecin des yeux », qui diagnostique et prescrit le traitement. Il oriente éventuellement vers l'orthoptiste pour un bilan et une prise en charge.
- L'**orthoptiste**, « kiné des yeux », qui travaille avec l'ophtalmologiste. Il rééduque les yeux de votre enfant et aide au diagnostic des troubles de la vue.
- L'**opticien**, sur prescription de l'ophtalmologiste, qui délivre des lunettes adaptées.

Action réalisée par :



Avec le soutien de :



Financée par :



En partenariat avec :



**LES TROUBLES DE LA VUE DOIVENT ÊTRE REPERES AU PLUS VITE.
UN TRAITEMENT RAPIDE AVEC UN SUIVI REGULIER PERMET
UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE LA VUE DE VOTRE ENFANT.**

