

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX AU CABINET MEDICAL : COVID-19, ET APRES?

Webinaire URPS médecins libéraux

07/10/2021

Dr LOCHER

CPias Hauts-de-France

Port du masque dans le contexte actuel

- La circulation virale est relativement faible mais reste supérieure à 10/100.000 (et à 35/100.000 dans 2 départements des HdF)
- Une personne vaccinée peut être porteuse du virus, qu'elle soit symptomatique ou non
- Le vaccin ne protège pas à 100% (non répondeurs, immunodéprimés...)
- Peu de visibilité sur l'évolution de l'épidémie
- D'autres virus refont leur apparition, et la période froide commence
- Baisse de l'immunité naturelle contre certains virus ayant peu circulé

Port du masque dans le contexte actuel

Pour toutes ces raisons et pour le moment :

- Patients : leur demander de porter un masque en salle d'attente et pendant la consultation sauf s'il est nécessaire de l'enlever pour examiner la personne (symptômes ORL).
- Professionnels : porter un masque chirurgical, que le patient ait ou non des symptômes évocateurs de Covid. Le changer régulièrement et **systématiquement après prise en charge d'un patient avec symptômes d'infection respiratoire**. Friction avant de le mettre et après l'avoir manipulé.

Post-Covid : maintenir la prévention du risque infectieux

- Socle « prévention et contrôle des infections » = **les précautions standard**
- Ensemble de mesures qui limite fortement la transmission des micro-organismes quels qu'ils soient
- A appliquer le mieux possible tout au long de l'année, pour tout patient, sans préjuger de son état infectieux
- A intégrer dans ses pratiques quotidiennes comme allant de soi
- Ce qui a été mis en œuvre contre le Covid-19 permet de prévenir la transmission de nombreuses autres infections

Post-Covid : maintenir la prévention du risque infectieux

- Hygiène des mains par friction hydro-alcoolique avant et après tout patient +++ sur mains sans bijou et avant-bras nus
- Port de gants à UU uniquement si contact avec liquide biologique
- Tenue dédiée au travail
- Avoir des EPI tout au long de l'année en particulier des masques
- Porter un masque devant tout patient qui tousse

Post-Covid : maintenir la prévention du risque infectieux

- Vérifier le type de produit détergent-désinfectant utilisé au cabinet
- Désinfection du petit matériel (stétho...) entre deux patients
- Désinfection des surfaces fréquemment touchées : à renforcer en période hivernale
- Aération régulière surtout si symptômes respiratoires
- Bonne gestion des déchets en particulier à risque d'AES (perforants)
- Impliquer les patients : port du masque si symptômes, friction en entrant, respect des horaires de rendez-vous...

TROD angine

- N'a jamais été interdit en cabinet médical
- N'est pas un geste à risque d'aérosolisation
- Doit être pratiqué dans le respect des précautions standard :
 - Friction hydroalcoolique avant de mettre les gants et après leur retrait
 - Port d'un masque chirurgical pendant le geste
 - Port de gants (manipulation d'un prélèvement biologique, contact avec les muqueuses)